



LUXATION TRAUMATIQUE BILATÉRALE DIVERGENTE DE HANCHE CHEZ L'ADULTE

HASROURI ILIES

Boussaha Toufik , Amrane Hemza , Khernane Nacer .
SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
CHU BATNA - ALGERIE

INTRODUCTION

Les luxations traumatiques bilatérales convergentes de hanche sont rares;
aucun cas de luxation bilatérale divergente n'a été rapporté dans la littérature.
Nous décrivons un cas de Luxation traumatique bilatérale divergente de hanche chez l'adulte.

OBSERVATION



Il s'agit d'un homme de 53 ans, sans antécédents particuliers, victime d'un accident de la voie publique.

Avec un mécanisme lésionnel complexe,
Le bilan lésionnel a objectivé une luxation traumatique bilatérale divergente de hanche a variété postérieure d' un côté et antérieure de l'autre.

La réduction des luxations a été réalisée sous anesthésie générale et était aisée.

La radiographie de contrôle a montré des hanches bien centrées.

Les suites étaient simples après une décharge de deux semaines. Les hanches sont restées souples sans limitations dans le secteur de mobilité habituel a un recul de 6 mois.



DISCUSSION

La luxation bilatérale traumatique de la hanche est très rare ; 51 cas ont été rapportés dans la littérature jusqu'à présent, le premier en 1936 par Marquardt.

La stabilité inhérente à l'articulation de la hanche explique la violence du traumatisme causal.

Quel que soit le type de luxation, l'action vulnérante ne peut avoir que trois points d'application :

la face antérieure du genou fléchi ; la plante du pied, genou en extension ; le grand trochanter.

La luxation postérieure survient sur un membre en flexion, adduction, rotation interne lors d'un impact antérieur sur le genou.

Par contre, la luxation antérieure survient en position d'abduction - rotation externe lors d'un impact sur la face interne du genou, avec effet came du grand trochanter sur l'ilion en abduction maximale

Pour notre cas; la lésion fait suite à la combinaison de deux mécanismes complètement différents pour réaliser une luxation bilatérale divergente.

CONCLUSION

Les luxations traumatiques bilatérales de hanche sont exceptionnelles, les formes divergentes le sont plus .elles sont faciles de réduction et ont un bon pronostic.

Bibliographie

- 1-Upadhyay S, Moulton A. The long term results of traumatic posterior dislocation of the hip. J Bone Joint Surg 1981;63B:548-51
- 2-Letteneur J, Fleuriel M, Sanguy D. Incarcération osseuse intra-articulaire après réduction de luxation de hanche.Problème diagnostique et thérapeutique. J Chir 1978; 115:97-10
- 3- Lam F, Walczak J, Franklin A. Traumatic asymmetrical bilateral hip dislocation in an adult. Emerg Med J 2001;18:506-7
- 4-Shukla PC, Cooke SE, Pollac Jr CV, Kolb JC. Simultaneous asymmetric bilateral traumatic hip dislocation. Ann Emerg Med 1993;22:1768-71
- 5-López-Sánchez M, Kovacs-Kovacs N. Bilateral asymmetric traumatic hip dislocation in an adult. J Emerg Med 2006;31:429-31

